

#### **PRZED UŻYCIEM MEDIXIL®:**

Nie należy stosować preparatu przez 48 godzin po goleniu /depilacji włosów, na skórę uszkodzoną, podrażnioną (np. egzema). W przypadku skóry uszkodzonej lub podrażnionej należy odczekać do momentu aż naskórek w pełni się odbuduje. Przed każdym użyciem skóra pod pachami musi być czysta i całkowicie sucha.

#### **JAK STOSOWAĆ ANTYPERSPIRANTY MEDIXIL® ROLL-ON :**

- MEDIXIL® jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę pod pachami
- Rozpoczynając stosowanie antyperspirantów MEDIXIL® należy nałożyć preparat na noc (przed położeniem się spać kiedy gruczoły potowe są najmniej aktywne) na czystą, całkowicie suchą, nieuszkodzoną i niepodrażnioną skórę
- Nałożyć cienką warstwę preparatu pod każdą pachę (2 obroty kulki ruchem w górę i 2 obroty kulki ruchem w dół)
- Po aplikacji należy odczekać do momentu, aż preparat całkowicie się wchłonie i skóra będzie sucha
- Rano należy zmyć pozostałość preparatu używając wody z mydłem
- Nie stosować ponownie rano lub po każdym myciu ciała ponieważ efekt działania preparatu utrzymuje się przez kilka dni od momentu użycia - zarówno w ciągu dnia jak i nocy
- Po każdym użyciu należy dobrze zakręcić buteleczkę aby zapobiec wyciekaniu produktu.

#### **Wskazówki dla osób, które używają profesjonalnych antyperspirantów MEDIXIL® Roll - on po raz pierwszy:**

- Jeżeli używasz antyperspirantu MEDIXIL® po raz pierwszy należy mieć na uwadze, że skóra musi przyzwyczać się do działania preparatu. W tym okresie może sporadycznie wystąpić swędzenie lub podrażnienie skóry pod pachami.
- Rozpoczynając stosowanie należy nakładać preparat co drugi dzień na noc przed snem.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy wydłużyć ilość dni pomiędzy każdą aplikacją według własnego uznania z uwzględnieniem reakcji skóry na ewentualne podrażnia.
- Kiedy nastąpi zauważalne zmniejszenie intensywności pocenia (zazwyczaj po okresie od 1 do 2 tygodni) należy zacząć stosować preparat co trzecią noc lub tak często jak zaistnieje potrzeba.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry celem jego załagodzenia, zaleca się użycie organicznego olejku ze słodkich migdałów po każdej aplikacji preparatu. Jeżeli podrażnienie skóry nie ustąpi po 3 lub 4 aplikacjach należy przerwać stosowanie preparatu.

#### **WAŻNE INFORMACJE:**

- Nie należy stosować antyperspirantu MEDIXIL® na swędzącą, zaczerwienioną, podrażnioną lub uszkodzoną skórę. Pieczenie lub swędzenie skóry po użyciu preparatu może wystąpić jeśli:
- Skóra pod pachami nie była całkowicie czysta lub sucha
  - Skóra pod pachami była podrażniona lub uszkodzona
  - Zastosowano zbyt dużo produktu lub po aplikacji preparat nie wchłonął się całkowicie w skórę.

- Bezpośrednio po aplikacji unikaj zakładania odzieży. Poczekaj do całkowitego wchłonięcia i wyschnięcia preparatu na skórze.
- Tylko do użytku zewnętrznego
  - Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi
  - Unikać kontaktu preparatu z biżuterią i powierzchniami metalowymi
  - W sporadycznych przypadkach wystąpienia reakcji alergicznych należy zaprzestać stosowania preparatu.

#### **PRZECHOWYWANIE:**

Przechowywać w temperaturze od 5 do 25 °C w miejscu niedostępnym dla dzieci.

#### **DODATKOWE INFORMACJE:**

Samokonserwujący - zawiera składniki przeciwbakteryjne o naturalnym działaniu konserwującym.